

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日				
	薬品名	投与量	day1	day14	
【肝】RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	○		
	休薬完了				休
	薬品名	投与量	day1	day21	
	アテゾリズマブ	1200 mg	○		
【肝】アテゾリズマブ + Bmab	ベシズマブ	15 mg/kg	○		
	休薬完了				休
	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	
【胆】GEM+CDDP	シスプラチン	25 mg/m ²	○	○	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○		
【胆】GEM+CDDP+S-1	シスプラチン	25 mg/m ²	○		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
	S-1体表面積(投与量) 1.25m ² 未満(80mg/日) 1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日) 1.5m ² 以上(120mg/日) 7日間服用、7日間休薬				
	【胆】GEM+S-1	薬品名	投与量	day1	day8
ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○	○	
休薬完了				休	
S-1体表面積(投与量) 1.25m ² 未満(80mg/日) 1.25m ² 以上1.5m ² 未満(80mg/日) 1.5m ² 以上(100mg/日) 14日間服用、7日間休薬					
【胆】デュルバルマブ		薬品名	投与量	day1	day28
	デュルバルマブ	1500 mg	○		
	休薬完了				休
	薬品名	投与量	day1	day8	day21
【胆】デュルバルマブ+GEM+CDDP	デュルバルマブ	1500 mg	○		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	シスプラチン	25 mg/m ²	○	○	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休

【臍】FOLFIRINOX	薬品名		投与量	day1	day14		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	オキサリプラチン		85 mg/m ²	○			
	レボホリナート		200 mg/m ²	○			
	イリノテガン		180 mg/m ²	○			
	フルオロウラシル		400 mg/m ²	○			
			2400 mg/m ²	○			
休薬完了					休		
【臍】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了					休	
【臍】GEM(RT併用)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ゲムシタビン	400 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了					休	
【臍】GEM+S-1	薬品名	投与量	day1	day8	day21		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○			
	休薬完了				休		
S-1投与量		60mg/m ² /日					
14日間服用、7日間休薬							
【臍】GEM+S-1(術前)	薬品名	投与量	day1	day8	day21		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○			
	休薬完了				休		
	S-1投与量						
	BSA 1.25m ² 未満 80mg/day 1.25以上1.5m ² 未満 100mg/day 1.5m ² 以上 120mg/day						
14日間服用、7日間休薬							
【臍】mFOLFIRINOX	薬品名		投与量	day1	day14		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	オキサリプラチン		85 mg/m ²	○			
	レボホリナート		200 mg/m ²	○			
	イリノテガン		150 mg/m ²	○			
	フルオロウラシル		2400 mg/m ²	○			
	休薬完了					休	
【臍】nabPTX+GEM	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】		1 A	○	○	○	
	バクリタキセル(アルギン懸濁)		125 mg/m ²	○	○	○	
	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了						休

